



NIEDRĀJU PUTNU NOTEICĒJS

NIEDRĀJU PUTNU NOTEICĒJS IR SAGATAVOTS PROJEKTĀ
«LIELĀ DUMPJA BIOTOPU ATJAUNOŠANA DIVOS PIEKRASTES EZEROS LATVIJĀ»,
LIFE12 NAT/LV/000118, LIFE COASTLAKE.



Latvijas Dabas fonds niedrājus ir atzinis par 2016. gada dzīvotni. Tā ir nozīmīga dzīves vieta dažādām sugām, to skaitā putniem. Ir sugas, kas dzīvo tikai niedrājos.

Niedres Latvijā ir plaši izplatītas, taču nebūt ne visur tās ir vienādi piemērotas niedrāju sugu dzīvei. Daudzām niedrājos ligzdojošo putnu sugām ir svarīga mozaīka, kurā niedrāji mijas ar atklāta ūdens platībām.

Šajā noteicējā iekļauti tikai paši tipiskākie niedrājos dzīvojošie putni. Sugas, kas ligzdo niedrāju – krūmāju pārejas joslā (piemēram, niedru stērste, ceru ļauķis), kā arī sugas, kas niedrājos tikai barojas (piemēram, zilzilīte), šeit nav apskatītas. Tāpat nav ietvertas pīles (brūnkaklis, cekulpīle, meža pīle) un paugurknābja gulbis, kas reizēm ligzdo vecu niedrāju malās vai nelielos slīkšņu fragmentos.

PASKAIDROJUMI

Ad. (latīniski *adultus*) – pieaudzis, ligzdošanas vecumu sasniedzis putns.

Caurceļotāji – putni, kas attiecīgajā teritorijā sastopami tikai vasaras un/vai rudens ceļošanas laikā.

Gājputni – putni, kas regulāri pārceļo no ligzdošanas vietām uz ziemošanas vietām un atpakaļ (pretstatā nometniekiem).

Planēšana – lidošana ar nekustīgiem, izplestiem spārniem, parasti izmantojot silto, augšupejošo gaisa plūsmu.

Riesta tērps un pēcriesta tērps – dažām sugām pieaugušo putnu (*ad.*) tērps atšķiras ligzdošanas laikā (riesta tērps) un ārpus ligzdošanas laika (pēcriesta tērps).

MEŽA ZOSS

Anser anser

Pazīmes

Gaišākā un viena no lielākajām pelēkajām (*Anser gins*) zosīm ar samērā resnu kaklu, lielu galvu un druknu knābi. Vecākiem putniem uz vēdera var būt melnas šķērsvītras. Lidojumā gan spārna virspusē, gan apakšpusē redzama gaiša spārna priekšējā daļa, kas kontrastē ar tumšākām lidspalvām un muguru virspusē, un tumšākām lidspalvām apakšpusē; astes galā plata balta joslā. Kājas rozā. Latvijā sastopamajai pasugai (*A. a. anser*) knābis bāli oranžs ar baltu galiņu, austrumu pasugai (*A. a. rubrirostris*) – rozā. Dažām var būt šaurs, balts gredzens ap knābja pamatni. Mazuļu pūku tērps dzeltens.

Uzvedība

Ligzdošanas sezonā pamanāmas maz – izturas neuzkrītoši, caurceļošanas laikā sastopamas lielākā skaitā, reizēm baros kopā ar citām zosu sugām, piemēram, sējas zosi.

Balss

Līdzīga mājas zosij: 

Līdzīgās sugas

Sējas zosij ir tumšāka galva un kakls, oranži melns knābis un oranžas kājas. Lidojumā astes gala baltā svītra šaura un neizteikta. Baltpieres zosij ad. balts laukums pie knābja pamata, kājas oranžas. Melnās šķērsvītras uz vēdera izteiktākas nekā meža zosij. Abām minētajām sugām tāpat kā reti sastopamajai mazajai zosij nav kontrastējoši gaišās spārnu priekšējās daļas.

Dzīvesveids

Pārtiek no augu valsts barības (dzinumiem, saknēm), barojas gan ūdeņos, gan uz laukiem. Ligzdo ar niedrājiem bagātīgi aizaugušās ūdenstilpēs. Ligzdu niedrājā parasti būvē no niedrēm, izklāj ar dūnām, dējumā 3–9 gaišas olas. Gājputns. Vienīgā zosu suga, kas Latvijā ligzdo, līdz ar to vienīgā, kas pie mums vasarā sastopama lielākā skaitā. Citas zosu sugas ir caurceļotājas, sastopamas tikai pavasaros un rudenos, izņemot atsevišķus īpatņus. Iespējams, ka nedaudzi putni pārzīmo arī Latvijā.


Meža
zoss

reti
sastopama
suga

ierobežoti
izmantojama
īpaši aizsargājama
suga



Peldoša meža zoss. Foto: Ainars Mankus



ZIVJU GĀRNIS

Ardea cinerea

Pazīmes

Mazliet mazāks par stārķi. Mugurpuse zilpelēka, vēderpuse un kakls gaiši pelēcīgi. Lidspalvas melnas. *Ad.* pierē, galvas virsa un vaigi balti, virs acīm tumšas joslas, kas uz pakauša savienojas un pāriet cekulā, balta josla, ko ietver melnas raustītas svītras kakla priekšpusē. Knābis pelēcīgi dzeltens, ligzdojošiem putniem ligzdošanas laikā oranžs. Kājas pelēcīgas vai pelēcīgi dzeltenas. Jaunie putni blāvāki, pierē un galvas virsa pelēka, pakaušis tumšpelēks ar īsu cekulu. Lidojumā ļoti raksturīgs ievilkts («S» veidā saliekts) kakls un lokveidā izliekti spārni. Lido lēniem, smagiem spārnu vēzieniem.

Uzvedība

Bieži redzams nekustīgi stāvam ūdens malā mediējot «uz gaidi», kā arī atpūzdamies stāvēt seklā ūdenī uz vienas kājas, salocītu kaklu.

Balss

Lidojumā raksturīgs skaļš, griezīgs sauciens:



Balsis ligzdošanas kolonijā:

Līdzīgās sugas

Latvijā līdzīgu radniecīgu sugu nav. No dzērves lidojumā var atšķirt pēc gārņa raksturīgā ievilkta kakla.

Dzīvesveids

Pārtiek galvenokārt no zivīm. Sastopams gan dažādos saldūdeņos, gan pie jūras. Parasti ligzdo kolonijās. Ligzdas no zariem būvē kokos, īpaši uz ezeru salām un mežos netālu no ūdens, dažkārt arī meža puduros lauku ainavā, ezeru krūmājā vai niedrājā. Dējumā 3–7 gaiši zilās olas. Gājputns, tomēr visai nelielā skaitā ziemo arī Latvijā pie neaizsalušiem ūdeņiem.

Zivju
gārnis

bieži
sastopama
suga

Latvijā sugai nav
noteikts īpašs
aizsardzības
statuss



Jauns zivju gārnis. Foto: Jānis Jansons



LIELAIS BALTAIS GĀRNIS

Egretta alba


Pazīmes

Liels putns ar pilnīgi baltu apspalvojumu. Mazāks par stārķi, mazliet mazāks arī par zivju gārni. Izteikti garš kakls un kājas. Riesta tērpā knābis melns ar dzeltenu pamatu, kailais sejas laukums pie acs zaļš, kājas tumšas ar dzelteniem apakšstilbiem. Pēcrista tērpā knābis dzeltens, kailais sejas laukums bāli zaļgans, kājas pelēkas ar gaišākiem apakšstilbiem. Jaunajiem putniem knābis dzeltens ar melnu galu. Lidojumā kakls ievilkts («S» veidā), labi redzamas kājas, kas stiepjas atpakaļ tālu aiz astes.

Uzvedība

Barojas gan grupās, gan pa vienam, parasti lēni bradājot pa sekliem ūdeņiem augāja malās.

Balss

Daudzveidīga, lidojumā raksturīgs zems «kraak», taču bieži novērojams klusējot: 

Līdzīgās sugas

Radniecīgais ļoti retais iecelotājs zīda gārnis ir mazāks, ar melnu knābi, riesta tērpā tam ir cekuls, kājas melnas ar dzeltenām pēdām. Baltajam stārķim melnas spārnu lidspalvas, lidojumā kakls nav ievilkts, kājas un knābis rozīgi sarkani, nekur nav dzeltenī zaļu nokrāsu.

Dzīvesveids

Pārtiek galvenokārt no zivīm. Ligzdo niedrājos pa vienam vai kolonijās, arī kopā ar zivju gārņiem. Ligzdu būvē no zariem, izklāj ar smalkākiem zariņiem. Dējumā 4–5 baltas līdz gaiši zilās olas. Latvijā zināmi vairāki gadījumi, kad baltais gārnis ligzdojis pāri ar zivju gārni. Latvijā ligzdojošo un caurceļojošo balto gārņu skaits palielinās. Ceļošanas laikā novērojami baros lielākā skaitā. Gājputns, atsevišķi putni var ziemot Latvijā.

Lielais
baltais gārnis

diezgan reti
sastopama
suga

Latvijā sugai nav
noteikts īpašs
aizsardzības
statuss



Baltais gārnis pēcrista tērpā. Foto: Jānis Jansons



LIELAIS DUMPIS

Botaurus stellaris

Pazīmes

Drukns putns ar dzeltenbrūni raibu krāsojumu. Ad. melni brūna galvas virsa un bārdas svītra, jaunajiem putniem tās gaišāk brūnas, apspalvojums blāvāks. Samērā īsas, zaļganas kājas proporcionāli gariem pirkstiem. Lidojumā raksturīgi plati spārni un ievilkts, drukns kakls, uz aizmuguri izstieptas kājas. Mazuļi klāti rūsganām pūkām.

Uzvedība

Apslēpts dzīvesveids, tādēļ biežāk izdodas dzirdēt nekā ieraudzīt. Kaklu mēdz ieraut plecos. Barojas, lēni brienot pa ūdeni, vai sastindzis, gaidot laupījumu. Iet ar sakumpušu muguru un izstieptu kaklu. Briesmu brīdī sastingst, paceļot augšup izstieptu kaklu un knābi, kakla svītrām vizuāli saplūstot ar niedrāju, un ir ļoti grūti pamanāms. Biežāk ieraugāms pārlidojumos vai riesta lidojuma laikā, kad tas riņķo gaisā virs savas ligzdošanas teritorijas.

Balss

Tēviņam ļoti īpatnēja, dobja riesta dziesma – «baurošana», kas atgādina pūšanu pudelē. Tā, atkārtota ar 2,5 sekunžu intervālu, dzirdama galvenokārt krēslā un tumsā līdz 5 km attālumam: 🗣️ Tuvumā saklausāma arī klusākā pirmā zilbe, kas skan kā elpas ievilkšana.

Lidojumā īss sauciens: 🗣️

(tuvumā citu putnu sugu balsis).

Līdzīgās sugas

Latvijā līdzīgu sugu nav.

Dzīvesveids

Pārtiek no zivīm, vardēm, kukaiņiem. Ligzdo plašos niedrājos seklās, aizaugušās ūdenstilpēs – ezeros, dīķos. Ligzdu no niedrēm būvē niedrājos ūdens līmeņa augstumā. Dējumā 3–6 gaišas olas. Gājputns, tomēr nelielā skaitā ziemo arī Latvijā pie neaizsalušiem ūdeņiem.

Lielais
dumpis

diezgan bieži
sastopama
suga

Īpaši
aizsargājama
suga



Lielais dumpis (ad.). Foto: Jānis Jansons

Lielais dumpis lidojumā (ad.).

Foto: Ēriks Tempelfelds



MAZAIS DUMPIS

Ichobrychus minutus


Pazīmes

Pēc lieluma līdzīgs kovārnim. *Ad.* tēviņam mugurpuse un galvas virsa melna, vēderpuse bāli oranždzeltēna ar gaišākām un tumšākām garenām svītrām. Lidojumā redzams ļoti raksturīgs liels krēmkrāsas (gandrīz balts) laukums uz spārniem. Mātītei galvas virsa un mugura brūna, laukums uz spārniem bēšā krāsā. Jaunie putni blāvāki, ar svītrainu mugurpusi, kaklu un spārna laukumu. Knābis dzeltenīgs ar melnu galu, kājas zaļganas. Lido ātriem, saraustītiem spārnu vēzieniem. Mazuļiem gaišs pūku tērps.

Uzvedība

Apslēpts dzīvesveids, aktīvs galvenokārt krēslā un tumsā. Mēdz pārlidot īsus attālumus. Lido ierautu kaklu, ātri vicinot spārnus pārmaiņus ar īslaicīgu planēšanu.

Balss

Dažādas aizsmakušas, kurkstošas skaņas, lidojumā īss «ek» vai «kvarķ». Dziesma atgādina suņa rejas:  (tuvumā skaļi dzied lakstīgala).

Līdzīgās sugas

Latvijā dažas reizes konstatētais nakts gārnis ir lielāks, masīvu knābi, *ad.* pelēks ar melnu knābi un sātām kājām. Jaunie nakts gārņi ir raibi – mugura un spārni brūni ar gaišiem pilieneida raibumiem, vēderpuse un galva raibi svītroti.

Dzīvesveids

Pārtiek no nelielām zivtiņām, vardēm, kukaiņiem. Ligzdo dažādos aizaugušos ūdeņos – zivju dīķos, ezeros un applūdušos karjeros. Ligzdu no zariem un citiem materiāliem būvē slēptās vietās krūmos vai vilkvālišu audzēs tuvu zemei. Dējumā 5–7 baltas olas. Gājputns. Latvijā reti sastopams.

Mazais dumpis

Ļoti reti sastopama suga

Īpaši aizsargājama suga

Mazais dumpis, ad. tēviņš. Foto: Edgars Smislovs
Mazais dumpis (ad. tēviņš) lidojumā.
Foto: Oļegs Miziņenko



DUMBRČĀLIS

Rallus aquaticus

Pazīmes

Mazliet lielāks par mežastrazdu. Griezēm, ormanīšiem un laučiem radniecīgs putns. Drukns, garām kājām un garu, mazliet uz leju noliektu knābi, kas garāks par galvu. No attāluma izskatās tumšs, redzama gaišā zemaste. *Ad.* virspuse brūna ar melniem gareniskiem raibumiem, galvas sāni, kakls un krūtis zilpelēkas, sāni ar melnbaltām šķērsvītrām. Knābis sarkans, kājas iesārtas. Jaunie putni pelēkbrūni raibi, bez zilpelēkās krāsas, ap acīm tumšāka «maska». Mazuļu pūku tērps melns, knābis gaišs.

Uzvedība

Dzīvesveids slēpts. Daudz biežāk dzirdams, nekā redzams. Dažkārt ieraugāms, pārskrienot kādu atklātu laukumiņu augājā. Asti tur paceltu gaisā un uztraukumā rausta. Labi kāpelē, arī peld. Iztraucēts var pārlidot nelielu gabalu, turot kājas uz leju un strauji vicinot spārnus.

Balss

Daudzveidīga, raksturīgi sivēna kvieciemiem līdzīgi saucieni: 

Līdzīgās sugas

Ormanītim un mazajam ormanītim knābis ir īsāks par galvu, kājas zaļganas. Ormanītim uz spārnjiem baltas šķērsvītras, mazajam ormanītim zemaste melnbalti svītrotā.

Dzīvesveids

Barojas galvenokārt ar ūdens bezmugurkaulniekiem. Sastopams seklos ūdeņos ar biezu augāju, slapjās pļāvās un zāļu purvos, arī aizaugušos bebru dīķos. Ligzda visbiežāk niedru vai vilkvālišu ceros, būvēta no sausām niedrēm vai citiem augiem. Dējumā 5–12 raibas olas. Gājputns, tomēr nelielā skaitā ziemo arī Latvijā pie neaizsalušiem ūdeņiem.

Dumbrčālis

diezgan bieži sastopama suga

Latvijā sugai nav noteikts īpašs aizsardzības statuss



Dumbrčālis (ad.). Foto: Jānis Jansons



NIEDRU LIJA

Circus aeruginosus

Pazīmes

Slaidis plēsīgais putns ar gariem spārniem un garu asti. Sugai raksturīga tumša (atšķirībā no citām lijām) virsaste. Tēviņa apspalvojuma krāsojumā kontrastējoši sarkanbrūnie un gaiši pelēkie toņi, krāsojums var variēt. Galva un krūtis pelēcīgas ar smalku svītrojumu, ķermenis sarkanbrūns, mugura un daļa spārnu virspuses sarkanbrūna, lidpalvas, spārnu apakšpuse un aste gaišpelēki. Spārnu gali melni. Vēders brūns. *Ad.* mātīte brūna ar gaiši dzeltenu spārnu priekšējo malu, galvas virsu un rīkli. Uz krūtīm var būt gaišs laukums. Spārnu apakšpuse pelēcīga, aste brūna. Jaunie putni tumšāk brūni nekā mātītes, parasti bez gaišajām spārnu priekšmalām.

Uzvedība

Daudz laika pavada lidojot. Bieži planē ar «V» veidā paceltiem spārniem. Medijot lido zemu virs augāja – niedrājiem un laukiem. Medījuma ķeršanas brīdī strauji krīt lejup.

Balss

Sauciens lidojumā: 

Līdzīgās sugas

Klijas lidojumā var atšķirt pēc šķeltas astes un planējot lokveidā izliektiem spārniem. Citu liju sugu mātītes un jaunie putni gaišāki, ar baltām vai gaišām virsastēm, savukārt tēviņi ir gaiši pelēki.

Dzīvesveids

Pārtiek no grauzējiem un putniem. Sastopama dažādās ar niedrājiem aizaugušās ūdenstilpēs, ar niedrājiem aizaugušās pļavās un bebru dižos. Barojas arī lauksaimniecības zemēs. Ligzda niedrājā uz zemes, būvēta galvenokārt no zariņiem un niedrēm, dējumā 2–6 gaišas olas. Gājputns.

Niedru
lija

bieži
sastopama
suga

īpaši
aizsargājama
suga



Niedru lijas tēviņš lidojumā. Foto: Ainars Mankus
Niedru lijas mātīte lidojumā. Foto: Jānis Jansons



SEIVI ĶAUĶIS

Locustella luscinioides

Pazīmes

Mazāks par zvirbuli, pelēcīgi brūns. Vēderpuse gaišāka. Krūtis bez raibumiem. Garas, brūnas zemastes segspalvas, kas sedz ap 3/5 no astes garuma, segspalvu galiņi neuzkrītoši gaišāki. Spārna ārmala vienmērīgi izliekta, ārējās lidspalvas ārmala gaišāka. Kājas pelēcīgi rozā. Tikai labi putnu pazinēji šo ķauķi pēc izskata spēj atšķirt no līdzīgām ķauķu sugām.

Uzvedība

Veikli ložņā, parasti dzied niedru galotnēs. Raksturīga astes raustišana.

Balss

Īss, ass sauciens. Dziesma – vienmuļš tirkšķis:



Līdzīgās sugas

Upes ķauķim mugurpuse tumši olīvbrūna, krūtis ar izplūdušām svītriņām, zemastes spalvas olīvbrūnas ar platiem gaišiem galiem, sedz ap 3/4 no astes garuma. Kārķļu ķauķim un Pallasa ķauķim mugurpuse ar tumšiem raibumiem. Ezera ķauķim ir taisna, vienkrāsaina spārna ārmala. Citas līdzīgās sugas nemēdz uzturēties niedrājos.

Dzīvesveids

Barojas ar kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem. Sastopams ezeru vai diķu niedrājos. Ligzdu no sausām lapām (galvenokārt niedru) un stiebrīņiem būvē starp niedru stublājiem vai sakneņiem. Dējumā 3–6 olas. Gājputns.

Seivi ķauķis

diezgan reti sastopama suga

īpaši aizsargājama suga



Seivi ķauķis. Foto: Jānis Jansons



EZERA ĶAUĶIS

Acrocephalus scirpaceus

Pazīmes

Mazāks par zvirbuli. *Ad.* mugura rūsganbrūna, ar kontrastējošu izteikti rūsganu krāsu muguras lejasdaļā un virsastē. Spārni tumšāki. Apakšpuse bāli rūsgana. Plakana, lēzena pierē, tievs knābis. Vāji izteikta uzacs svītra, kas beidzas līdz ar aci. Rīkle balta. Gaišas zemastes segspalvas, tās sedz ap 3/4 astes garuma. Kājas brūnganpelēkas. Jaunajiem putniem vēders un sāni dzeltenbrūni. Tikai labi putnu pazinēji šo ķauķi pēc izskata spēj atšķirt no līdzīgām ķauķu sugām.

Uzvedība

Slēpts dzīvesveids. Dzied niedru augšējā daļā, bet ne atklātās vietās. Dziedot reti atver knābi līdz galam vaļā.

Balss

No citām ķauķu sugām visdrošāk atšķirt pēc dziesmas: 

Sauciens – zems «ček», «če-ček» vai «krrr».

Līdzīgās sugas

Krūmu ķauķim rīkle nav balta, zemastes segspalvas sedz pusi astes garuma, izteiktāka uzacs svītra un redzams acs gredzens. Purva ķauķim virsaste dzeltenbrūna vai brūna, kājas dzeltenīgas.

Dzīvesveids

Barojas galvenokārt ar kukaiņiem. Sastopams dažādos niedrājos, ceļošanas laikā – arī krūmājos. Ligzdu no niedru dzinumiem un lapām, augu pūkām un zirnekļu tīmekļiem būvē starp niedrēm 1–1,5 m augstumā. Dējumā 4–6 raibas olas. Gājputns.

Ezera ķauķis

bieži sastopama suga

Latvijā sugai nav noteikts īpašs aizsardzības statuss

Ezera ķauķis. Foto: Jānis Jansons



NIEDRU STRAZDS

Acrocephalus arundinaceus

Pazīmes

levērojami lielāks par citiem ļauķiem. Samērā masīvs knābis. Ad. virspuse pelēkbrūna ar kontrastējoši rūsganbrūnu muguras lejasdaļu un virsasti. Spārni tumšāki. Izteikta, bet šaura uzacs svītra, redzams acs gredzens. Seja pelēcīga. Vēderpuse gaiša ar viegli rūsganiem sāniem. Kājas brūnganpelēkas. Jaunajiem putniem vēderpuse rūsgani bēša.

Uzvedība

Raksturīga dziedāšana atklātā, labi redzamā vietā niedru augšdaļā. Dziedot mēdz kāpt pa niedrēm uz augšu. Sabož galvas spalvas. Reizēm lido ar izplestu asti.

Balss

Saucieni – ass «kek», čerkstošs «krrr». Dziesma skaļa, griezīga, dzirdama vairāk nekā kilometra attālumā: 🔊

Līdzīgās sugas

Visi citu sugu ļauķi ir augumā ievērojami mazāki. Pēc apspalvojuma krāsām vislīdzīgākais ir ežera ļauķis.

Dzīvesveids

Pārtiek galvenokārt no kukaiņiem. Sastopams dažādos niedrājos. Ligzdu no niedru lapām un skarām būvē starp niedrēm, vilkvālitēm vai niedrājos ieaugušu krūmu zariem ap 1–1,5 m augstumā. Dējumā 2–6 raibas olas. Gājputns.

Niedru
strazds

bieži
sastopama
suga

Latvijā sugai nav
noteikts īpašs
aizsardzības
statuss

Niedru strazds. Foto: Ainars Mankus



BĀRDZĪLĪTE

Panurus biarmicus

Pazīmes

Nedaudz mazāka par lielo zīlīti. Aste gara. Mugurpuse dzeltenīgi rūsgana. Tēviņiem galva zilpelēka, izteiktas melnas bārdas svītras un melnas zemastes spalvas. Rīkle balta. Knābis dzelteni oranžs. Mātītei ķermenis un galva dzeltenīgi rūsgana. Knābis dzeltens. Jaunie putni atšķiras no mātītēm ar melnu muguru un melnām astes malām. Jaunajiem tēviņiem knābis oranždzeltens, jaunajām mātītēm – pelēcīgi brūns vai tumšpelēks.

Uzvedība

Kāpelē pa niedrēm, reizēm zemu pārlido virs tām. Bieži rausta asti. Lidojums nevienmērīgi vilņveidīgs. Ligzdošanas laikā dzīvesveids slēptāks. Rudenī un ziemā uzturas bariņos, bieži savstarpēji sasaucas, kā arī sēž uz niedru skarām, kur barojas ar sēklām.

Balss

Līdzīgās sugas

Garasītei līdzīga ķermeņa forma, taču tai nav dzeltenīgi rūsgano krāsu.

Dzīvesveids

Ligzdošanas sezonā barojas ar sīkiem kukaiņiem, ziemā – ar niedru sēklām. Sastopama aizaugušos ezeros un dīķos ar plašiem niedrājiem un vilkvālišu audzēm, ūdens lāmām un krūmājiem. Ligzdu būvē no sausām niedru lapām starp niedru stublājiem vai dižo aslapju cerā nelielā augstumā no zemes. Ligzda blodveida, izklāta ar niedru skarām, sīkām putnu spalvām un dūnām. Dējumā 4–8 gaišas olas ar sīkiem, gariem raibumiņiem. Gadā 2–3 un dažkārt pat vairāk perējumu. Daļējs gājputns – liela daļa pie mums ligzdojošo putnu ziemo tepat.

Bārdzīlīte

diezgan reti sastopama suga

īpaši aizsargājama suga



Bārdzīlītes tēviņš. Foto: Ilze Priedniece
Bārdzīlītes mātīte barojas ar niedru sēklām.
Foto: Jānis Jansons



LITERATŪRA

LOB 1999. Latvijas ūdeņu putni. Rīga.

Svensson L., Grant P. J., Mullaney K., Zetterström D. 1999.
The Collins bird guide. HarperCollins, London.

www.ornitofaunistika.com

<http://putnidaba.lv/audio/>

